

## Po 10 : Prévalence et facteurs associés à la dysfonction érectile chez le patient hypertendu à Abidjan, Côte-d'Ivoire

Soya E, **Migitaba H Moctar\***, Said Brahim S, Koffi Florent, Abdoul Wahab Bandabou AK, Maliki Abdoulaye M, Konin C, Toure AI

**Auteur correspondant** : Migitaba H Moctar, Institut de Cardiologie d'Abidjan, E-mail : [migitabamoctar12@gmail.com](mailto:migitabamoctar12@gmail.com).

**Introduction** : La dysfonction érectile (DE), ou trouble de l'érection, est définie comme l'incapacité persistante ou récurrente à obtenir et/ou maintenir une érection suffisante pour permettre un rapport sexuel satisfaisant. **Objectif** : Déterminer la prévalence et les facteurs associés à la dysfonction érectile (DE) de Patients hypertendus. **Matériels et méthode** : Il s'agissait d'une étude observationnelle, de type transversal, à visée descriptive et analytique, sur une période de 5 mois allant du 1<sup>er</sup> Mars au 30 juin 2025, à partir de l'indice international de la fonction érectile (IIEF) dans sa traduction française. **Résultat** : Ainsi, 210 patients hypertendus, âgés de 19 à 88 ans, ont été étudiés. L'âge médian était de 61 ans. La prévalence de la DE était de 24,7 % (51 patients). Parmi les 51 patients présentant une dysfonction érectile, 34 ont donné leur consentement pour la réalisation de l'écho doppler pénien pharmaco induit, soit une proportion de 16,2%. Cette DE était sévère chez 11 (21,56%) de ces patients. Les facteurs associés à la DE étaient l'âge, l'existence d'un diabète ( $p = 0,025$ ), la dyslipidémie ( $p = 0,035$ ), et l'ancienneté de l'hypertension ( $p=0,07$ ). **Conclusion** : La dysfonction érectile (DE) constitue une complication fréquente chez les patients hypertendus.

**Mots-clés** : Dysfonction érectile, HTA, prévalence, facteurs associés, Cote D'Ivoire.