

## Po 22 : Evaluation de l'anxiété et de la dépression chez les patients hémodialysés chronique au Centre Hospitalier Yalgado Ouédraogo de 2024 2025

Dianda Alassane<sup>1,2\*</sup>, Sanou Gaoussou<sup>1,2</sup>, Coulibaly SiéJeff Abass<sup>1,3</sup>, Bonzi Yéremadè Juste<sup>1,2</sup>, Kienou Abdias<sup>1,2</sup>, Kadio Ahmed Sati<sup>1</sup>, Coulibaly Gérard<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Service de néphrologie et hémodialyse du CHU Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso ; <sup>2</sup>UFR Science de la Santé Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso ; <sup>3</sup>UFR Science de la Santé Université Saint Thomas D'Aquin, Burkina Faso

*Auteur correspondant* : Dianda Alassane, E-mail : [las.dianda@gmail.com](mailto:las.dianda@gmail.com).

**Introduction** : L'anxiété et la dépression sont de véritables problèmes de santé publique. En cas de maladie chronique et chez le patient hémodialysé en particulier le risque de survenu est encore plus élevé. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'anxiété et la dépression chez les patients hémodialysés chroniques au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO) de 2024 à 2025. **Matériels et méthode** : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée de Novembre 2024 à Mai 2025 au service de néphrologie et hémodialyse du CHUYO. Nous avons inclus les patients hémodialysés chronique âgés de plus de 15 ans. Les échelles psychométriques de l'anxiété et de la dépression (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) et Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) ont été utilisées pour évaluer les symptômes anxieux et dépressif. N'ont pas été inclus les patients avec antécédant personnel de trouble psychiatrique avant le traitement par hémodialyse. **Résultats** : Au total 196 patients dont 105 hommes. La sex-ratio était de 1,2. La moyenne d'âge était de 43,8±11,3 ans. L'anxiété était présente chez 70,9% des patients avec 65,4% d'anxiété légère. La dépression a été mise en évidence chez 74% des patients avec 59,3% cas de dépression légère. Les troubles anxiodépressifs ont été retrouvé chez 61,7% des patients, la fréquence de l'anxiété et dépression associé. **Conclusion** : Un dépistage systématique des symptômes anxieux et dépressifs associé à un soutien psychologique permettraient d'améliorer la prise en charge globale des patients hémodialysés chroniques.

**Mots-clés** : Anxiété, dépression, hémodialysés chroniques, Burkina Faso.