

Po 24 : Anus vulvaire prise en charge au service d'urologie de l'Hôpital National de Niamey

Seydou HA*, Abdoulaye I, A Razak HZ, Moctar A

Service d'Urologie, Hôpital National de Niamey

Auteur correspondant : Seydou HA, Université Abdou Moumouni de Niamey, E-mail : seydouhamadou10@gmail.com.

Introduction : Anus vulvaire est une forme fréquente des MAR basses de la jeune fille qui sont plus fréquentes que les hautes. Nous rapportons un cas opéré et suivi au service d'Urologie de l'Hôpital National de Niamey. **Observation** : Il s'agissait d'une patiente âgée de 2ans sans ATCD pathologique, vu en consultation pour malformation anorectale découverte à la naissance par la sage-femme qui avait retrouvé la présence de 3 orifices dans la fourchette vulvaire, une absence d'abouchement anale. Elle aurait bénéficié des soins postnataux immédiats puis référée pour meilleure prise en charge. L'examen physique avait retrouvé une issue de méconium dans la fourchette vulvaire, un méat urinaire, un vagin et une absence de l'anus à son emplacement normal, une absence de malformation associée (VACTREL) puis programmée pour acte dans une année. Au bloc sous AG incision péri-fistulaire, dissection de l'anus vulvaire jusqu'au rectum, tunnelisation à travers le sphincter anal externe, abaissement du rectum à travers le tunnel, amarrage du canal anal au sphincter anal externe, régularisations de l'orifice anal au plan cutané, tampon, recto-vaginal. Les suites opératoires étaient favorables. **Conclusion** : Entité rare découverte à la naissance, une abstinence thérapeutique au préalable avant d'envisager la réalisation du néo-anus, une surveillance à long terme est nécessaire pour un meilleur résultat.

Mots-clés : MAR basse, anus vulvaire, néo-anus.