

Po 38 : Extériorisation testiculaire congénitale par défaut scrotal ou « scrotoschisis » : à propos de 2 cas au service de chirurgie pédiatrique de l'HNABD de Niamey

Moustapha H, Ali Ada MO, Issoufou HSM, **Tisembe Lamsikreo**, Thomas GA, Abdoulaye A, Diori A, Yaro I, Dan Malam K, Gambo I, Foaleng Toche K, Abarchi H

Auteur correspondant : Tisembe Lamsikreo, Résident en chirurgie pédiatrique, Service de chirurgie pédiatrique « Pr Habibou ABARCHI » /Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD), Niamey/ Niger, E-mail : lamsikreotisembe@gmail.com.

Introduction : Le « scrotoschisis » ou extériorisation des testicules par un défaut scrotal congénital est une malformation uro-génitale rare. Nous rapportons deux cas dans le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo. **Observations** : **Cas N°1** : Nouveau-né de H10 de vie pesant 3200 grammes, issu d'un mariage consanguin, reçu pour malformation scrotale, mère âgée de 19ans, G2P2, dont la grossesse malsuivie était menée à terme, avec accouchement eutocique. La malformation découverte à la naissance retrouve une extériorisation complète des deux testicules à travers un défaut scrotal. Le traitement fut chirurgical sous AG par des sutures par des points des simples, après un recul de 6 mois, aucune complication observée. **Cas N°2** : Nouveau-né à J1 de vie admis pour défaut scrotal droit congénital avec extériorisation du testicule. Avec une notion de consanguinité, grossesse mal suivie et accouchement à domicile. Une extériorisation du testicule droit était notée à travers un défaut scrotal unique. Le traitement chirurgical par parage, orchidopexie et suture cutanée, avec une évolution à long terme sans complications. **Conclusion** : Le scrotoschisis est une malformation génitale rare. Le traitement est chirurgical avec des bons résultats.

Mots-clés : scrotoschisis, malformation, nouveau-né, chirurgie.