

**COO 46 : Quelle prise en charge pour les tumeurs primitives de la paroi thoracique ?**

Issoufou I\*, Rabiou S, Amadou D, Maitouraré A

**Auteur correspondant** : Issoufou Alzouma Ibrahim, chirurgien thoracique, service de chirurgie thoracique, hôpital Général de Référence, Niamey-Niger, E-mail : [alzoumib84@gmail.com](mailto:alzoumib84@gmail.com).

**Introduction** : Les tumeurs primitives de la paroi thoracique sont rares et représentent un groupe très hétérogène. Le diagnostic est facilité par les moyens d'imagerie. L'exérèse chirurgicale reste une approche fiable et améliore le pronostic. **Matériels et méthode** : il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive sur une période de 4 ans portant sur 12 patients présentant une tumeur primitive de la paroi thoracique prise en charge par l'équipe de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l'HGR. **Résultat** : La fréquence des TPPT était de 7,61%. Le sexe féminin était prédominant avec 7 cas soit 58,3%. L'âge moyen était de 33,92 ans avec des extrêmes de 9 et 73 ans. La tuméfaction pariétale était le maître symptôme retrouvé chez tous nos patients. La TDM a mis en évidence une prédominance des tumeurs des tissus mous (67%). Une biopsie chirurgicale pour confirmation histologique a été réalisée chez 5 patients. Cinq patients ont bénéficié d'une résection chirurgicale. La pariéctomie a été réalisée dans 2 cas suivie des kystectomies. Deux patients ont bénéficié d'une reconstruction pariétale avec une plaque prothétique de polypropylène, renforcée par lambeau musculo-cutané. L'examen anatomopathologique a révélé 6 cas de tumeurs malignes. Un traitement adjuvant a été indiqué chez 3 patients. **Conclusion** : Les tumeurs primitives de la paroi thoracique nécessitent une prise en charge adaptée dans des structures spécialisées, multidisciplinaires gage d'une amélioration de la survie et du pronostic.

**Mots-clés** : Paroi thoracique, Tumeurs primitives, Exérèse, Sarcome, Neurofibrome.