

COO 48 : Pseudarthrose spinotubérosaire du plateau tibial, à propos d'un (1) cas à Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) de Niamey

Dalatou MMMH, **Altiné IM***, Abdoul Moutalib AA, Moussa Niandou A, Abdoul Wahab MA

Auteur correspondant : Altiné Inno Maliki, interne des hôpitaux du Niger, résident en chirurgie orthopédique et traumatologique, Faculté des Sciences de la Santé/UAM, E-mail : malick14.ma@gmail.com.

Introduction : La pseudarthrose se définit par l'absence de consolidation d'une fracture après un délai moyen de six (6) mois. Il s'agit d'une complication rare pour les fractures du plateau tibial. Les séries publiées font état d'un taux inférieur à 3%. Nous rapportons le cas d'un patient ayant présenté cette complication hors toute intervention médicale. **Observation** : Patient de 39 ans sans antécédents pathologiques notables. Vu en consultation 12 mois après un traumatisme fermé du genou droit. Il aurait entrepris un traitement traditionnel sans succès. Sa consultation était motivée par la persistance d'une gonalgie, une impotence fonctionnelle relative du membre pelvien, et une déformation axiale. Après bilan clinique et d'imagerie, le diagnostic d'une pseudarthrose aseptique du condyle médial du tibia était retenu. Le patient a bénéficié d'un traitement chirurgical par double abord associant décortication, relèvement, greffe osseuse autologue, et plaque anatomique. L'évolution est favorable avec un bon début de consolidation. **Conclusion** : Complication relativement rare des fractures du plateau tibial. Elle s'observe essentiellement après chirurgie à ciel ouvert.

Mots-clés : Pseudarthrose, Plateau tibial, HNABD, Niamey.